



I Congresso de  
**Ciências do Mar na  
Margem Equatorial  
Brasileira**

# O PAPEL DOS CENTROS DE REABILITAÇÃO: ESTAMOS PREPARADOS?

Prof. Ana Sílvia Sardinha Ribeiro



# CONTEXTUALIZAÇÃO

- **Atividade recente**
- **Equipes em formação**
  - **Capacitação técnica e realização de treinamentos**
- **Pesquisa em desenvolvimento**
- **Fator Amazônia**
  - **Custos elevados**



# O QUE A LEGISLAÇÃO DIZ:

Home






**III – definir as condições mínimas necessárias aos centros e instalações de resposta à fauna oleada;**



# PAE FAUNA

Home







# FACHADA DE ACESSO



Fonte: Arquivo CETRAS UFRA

# CONSULTÓRIO



# Sala de preparo de alimentos



Fonte: Arquivo CETRAS



# Internamento 1



Fonte: Arquivo CETRAS



Fonte: Arquivo CETRAS

# Área externa



Fonte: Arquivo CETRAS

# Área de despetrolização/convivência



Fonte: Arquivo CETRAS

**Obs: Consideramos como área coringa, pois pode ser desmobilizada quando tiver ocorrência que exija a aplicação do protocolo de despetrolização.**


# Internamento 2 - Recintos pré-soltura



Fonte: Arquivo CETRAS

# Internamento 2 - Recintos pré-soltura





O que mudou?





**Parcerias**

**Capacitação**

**PMAVE**

**Currículo**

**Novas linhas  
de pesquisa**


**Novas demandas**







# Animais atendidos no CETRAS



**Origem:** Salvaterra, Bagre, São Sebastião da Boa Vista, Soure, Salinas, Curuçá.



**Espécies:** *Chelonia mydas*;  
*Caretta caretta*;  
*Eretmochelys imbricata* ;  
*Lepidochelys olivácea*.



**Situação:** afogamento, captura em rede de pesca, encalhe na praia, presa em curral; alteração de flutuabilidade.

Fonte: Arquivo CETRAS UFRA



Fonte: Arquivo CETRAS UFRA

Figura 10 - Lesões cutâneas sugestivas de fibropapilomatose em exemplares de *Chelonia mydas* atendidas no CETRAS-UFRA.



Legenda - bito dorsal onde podem ser evidenciados numerosos fibropapilomas acima das nadadeiras anteriores. (B) Mesmo animal da imagem anterior evidenciando números fibropapilomas em região inguinal, cauda e abaixo das nadadeiras posteriores. (C.) Outro exemplar *C. mydas* apresentando fibropapilomas menores ao redor do globo ocular. (D) Imagem da porção ventral





# Ainda não atendeu o mínimo...



**Obrigada!**

[ana.ribeiro@ufra.edu.br](mailto:ana.ribeiro@ufra.edu.br)

[cetras@ufra.edu.br](mailto:cetras@ufra.edu.br)

